

Mongolia

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Todas las mujeres | Usuaris totales de métodos anticonceptivos modernos* | | | | | | | | | | |
| | 280,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
| | Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm) | | | | | | | | | | |
| | 35.9% | 35.9% | 36.0% | 36.1% | 36.1% | 36.3% | 36.4% | 36.9% | 37.2% | 37.5% | 37.8% |
| | Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm) | | | | | | | | | | |
| | 17.2% | 17.3% | 17.2% | 17.2% | 17.1% | 17.0% | 16.9% | 16.8% | 16.6% | 16.4% | 16.3% |
| | Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm) | | | | | | | | | | |
| | 67.5% | 67.5% | 67.6% | 67.8% | 67.8% | 68.0% | 68.3% | 68.8% | 69.1% | 69.4% | 69.8% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mujeres casadas | Usuaris totales de métodos anticonceptivos modernos* | | | | | | | | | | |
| | 230,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| | Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm) | | | | | | | | | | |
| | 49.4% | 49.2% | 49.2% | 49.1% | 49.1% | 49.1% | 49.4% | 49.7% | 50.4% | 50.9% | 51.5% |
| | Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm) | | | | | | | | | | |
| | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.6% | 21.5% | 21.2% | 21.0% | 20.7% | 20.4% |
| | Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm) | | | | | | | | | | |
| | 69.4% | 69.2% | 69.4% | 69.4% | 69.4% | 69.3% | 69.6% | 70.1% | 70.5% | 71.0% | 71.3% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mujeres solteras | Usuaris totales de métodos anticonceptivos modernos* | | | | | | | | | | |
| | 50,000 | 49,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 51,000 | 51,000 | 53,000 | 54,000 | 56,000 | 58,000 |
| | Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm) | | | | | | | | | | |
| | 15.6% | 15.4% | 15.5% | 15.6% | 15.8% | 15.9% | 16.1% | 16.4% | 16.7% | 17.0% | 17.2% |
| | Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm) | | | | | | | | | | |
| | 10.3% | 10.4% | 10.2% | 10.0% | 9.9% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 9.5% | 9.6% | 9.7% |
| | Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm) | | | | | | | | | | |
| | 59.9% | 59.7% | 60.3% | 60.9% | 61.3% | 62.1% | 62.5% | 62.9% | 63.5% | 63.7% | 63.7% |

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos | | | | | | | | | | | |
| | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 120,000 |
| Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos | | | | | | | | | | | |
| | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 |
| Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Años Protección Pareja (APP)

Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina

| Fuente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Resultados de fertilidad

| | Valor | Fuente |
|--|-------|-----------|
| Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19) | 43 | 2018 MICS |
| Porcentaje de nacimientos no intencionales | 25% | 2018 MICS |

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Número estimado de embarazos no deseados | | | | | | | | | | |
| 170,000 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 170,000 | 170,000 |

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

| Combinación de métodos anticonceptivos modernos | | | |
|---|------------------------------|-------|--------------------------------|
| Métodos permanentes y de acción prolongada | Esterilización (feminino) | 5.8% | Fuente 2018 MICS |
| | Esterilización (masculino) | 0.2% | |
| | DIU | 57.7% | |
| | Implante | 4.7% | |
| Métodos a corto plazo | Inyectable | 4.7% | Población Todas las mujeres |
| | Píldora | 15.6% | |
| | Condón (masculino) | 10.1% | |
| | Condón (feminino) | 0.9% | |
| | Método amenorrea lactacional | 0.2% | |
| | Método de Días Fijos | 0.0% | |
| | Otros métodos modernos | 0.0% | |

| Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación | | | |
|--|------------------------------|-----|---------------|
| Métodos permanentes y de acción prolongada | Esterilización (feminino) | --- | Fuente --- |
| | Esterilización (masculino) | --- | |
| | DIU | --- | |
| | Implante | --- | |
| Métodos a corto plazo | Inyectable | --- | Año --- |
| | Píldora | --- | |
| | Condón (masculino) | --- | |
| | Condón (feminino) | --- | |
| | Anticoncepción de emergencia | --- | |
| | Other modern methods | --- | |

| | Valor | Fuente | Año |
|---|-------|--------|-----|
| Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación | --- | --- | --- |
| Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación | --- | --- | --- |

| Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses) | | | | | | |
|---|-----|----------|------------|---------|--------------------|--------|
| | DIU | Implante | Inyectable | Píldora | Condón (masculino) | Fuente |
| Descontinuación mientras está en necesidad | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descontinuación mientras no se necesite | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Descontinuación total (todas las razones) | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Cambio de método anticonceptivo | --- | --- | --- | --- | --- | |

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

| | Valor | Fuente | Población |
|---|-------|--------|-----------|
| Indice de la información recibida durante suministro de metodo** | --- | --- | --- |
| Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud | --- | --- | --- |
| Porcentual de las usuarias actuales de metodos modernos de anticoncepcion segun fuente de suministro mas reciente. | | | |
| Público | --- | | --- |
| Medica privada | --- | --- | |
| Otro | --- | | |
| Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja | --- | --- | --- |

Inversión en planificación familiar

| | Valor | Fuente | Año |
|--|-------|--------|-----|
| Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$) | --- | --- | --- |

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales no alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022) y, por lo tanto, no se informa para este país.

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Todas las mujeres | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mujeres casadas | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mujeres solteras | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012

* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.